

MonaVie Active™

WZMACNIA ORGANIZM I FUNKCJONOWANIE STAWÓW

MonaVie Active to zaawansowana mieszanka 19 owoców z brazylijską **jagodą Acai** na czele, korzystnie wpływająca na stan zdrowia człowieka, wzbogacona o glukozaminę pochodzenia roślinnego. Naukowo wykazano, że glukozamina jest niezmiernie ważna w utrzymaniu zdrowych stawów i znacznie zwiększa mobilności i elastyczności stawów i ścięgien. Precyzyjnie dobrana mieszanka owoców i glukozaminy hamuje zużycie stawów jak i służy ich odnowie.

MonaVie Active to szczytowy poziom przeciwutleniaczy i składników odżywczych w synergicznym połączeniu:

Jagoda Acai, białe winogrona, jabłko, acerola, aronia, purpurowe winogrona, żurawina, owoce męczennicy, suszone śliwki, kiwi, leśna jagoda, borówka czarna, jagoda goji, granat, owoc liczi, camu-camu, gruszka, banan, cupuaçu.



Kluczowe korzyści:

Wzmocnienia organizm i zdrowie stawów zwiększając mobilności i elastyczności ruchową.

Wydajne odżywianie organizmu niezbędne do utrzymania dużych zdolności ruchowych człowieka.

Glukozamina wspiera produkcję glikoprotein, które są niezbędne do tworzenia i utrzymania zdrowej tkanki łącznej oraz chrząstki stawowej.

Zapewnia utrzymanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Istotne fakty:


Badania wykazują, że picie 120ml. **MonaVie Active** dziennie może zwiększyć działanie antyoksydacyjne w organizmie. (więcej informacji na <http://www.monavie.com/science>).

Osoby, które regularnie spożywają **MonaVie Active** odnotowały wzrost witalności i poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Obszerne badania przeprowadzono na **MonaVie Active** potwierdzają, że w składzie mieszanki nie ma substancji zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową WADA.

Badanie zakresu ruchu *

W ciągu 12 tygodni badań nad **MonaVie Active**, wszyscy uczestnicy wykazali statystycznie istotną poprawę w zakresie ruchu w odniesieniu do lędźwi i kolan. Ponadto, uczestnicy zauważyli znaczny spadek ogólnego dyskomfortu odczuwanego przed 8 i 12 tygodniami.



*Badanie zostało przeprowadzone w stosunkowo niewielkiej liczbie zdrowych osób dorosłych. Dalsze badania z większą ilością prób są niezbędne, aby te wyniki można uogólnić do ogółu ludności.